

**DM n°3***Un tétraèdre***Question préliminaire:**

Soit un triangle équilatéral ABC de côté  $c$ . On appelle H le pied de la hauteur issue de A.

D'après Pythagore dans le triangle ABH, la longueur AH vérifie  $AH^2 + HB^2 = AB^2 = c^2$

Comme  $HB = \frac{c}{2}$  on a  $AH^2 = c^2 - \left(\frac{c}{2}\right)^2$  soit  $AH^2 = \frac{3c^2}{4}$  c'est à dire  $AH = \sqrt{3} \frac{c}{2}$  car AH est une quantité positive.

L'aire du triangle ABC est donnée par  $\mathcal{A} = \frac{AH \times c}{2}$  donc  $\mathcal{A} = \frac{\sqrt{3}c}{2} = \sqrt{3} \frac{c^2}{4}$

**Problème:**

1. D'après le théorème des milieux dans le triangle ABD, on a les droites (AB) et (IJ) parallèles.
2. De plus  $IJ = \frac{AB}{2}$ . Le périmètre  $P'$  du triangle IJK vaut  $IJ + JK + IK$  donc, en appliquant le

théorème des milieux dans les triangles ADC et BCD, on a  $P' = \frac{AB}{2} + \frac{BC}{2} + \frac{AC}{2}$

d'où  $P' = \frac{AB + BC + AC}{2} = \frac{P}{2}$

3. IJK est isocèle car  $IJ = \frac{AB}{2}$ ,  $JK = \frac{BC}{2}$  et  $IK = \frac{AC}{2}$  et  $AB = BC = AC$  (tétraèdre régulier).

D'après la question préliminaire, l'aire  $\mathcal{A}'$  du triangle IJK vaut donc  $\sqrt{3} \frac{IJ^2}{4}$  et l'aire  $\mathcal{A}$  du triangle

ABC vaut  $\sqrt{3} \frac{AB^2}{4}$ . Or  $IJ = \frac{AB}{2}$  donc  $\mathcal{A}' = \sqrt{3} \frac{\left(\frac{AB}{2}\right)^2}{4} = \sqrt{3} \left(\frac{AB^2}{4}\right) \left(\frac{1}{4}\right) = \sqrt{3} \frac{AB^2}{16}$

donc  $\mathcal{A}' = \frac{\mathcal{A}}{8}$